

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1963

THÈSE

N° 1064

POUR LE

DOCTORAT EN MÉDECINE

DIPLOME D'ÉTAT

PAR

Jacqueline LACHEZE

née le 24 Juillet 1935 à St-JUST-en-CHAUSSEE (Oise)

Présentée et soutenue publiquement le : 1963

LA REALIMENTATION DANS LES DIARRHEES AIGUES
DU NOURRISSON.

Président: Mr. Julien MARIE, Professeur

EDITIONS A. G. E. M. P. — 8, RUE DANTE . PARIS-V.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41550205_0022

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1963

THÈSE

N°

POUR LE

DOCTORAT EN MÉDECINE

DIPLOME D'ÉTAT

PAR

Jacqueline LACHEZE

née le 24 Juillet 1935 à St-JUST-en-CHAUSSEE (Oise)

Présentée et soutenue publiquement le :

LA REALIMENTATION DANS LES DIARRHEES AIGUES
DU NOURRISSON.

Président: Mr. Julien MARIE, Professeur

EDITIONS A. G. E. M. P. — 8, RUE DANTE . PARIS-V.



PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. Alajouanine (T.), Aubin (A.), Bénard (H.), Bulliard (H.), Cadenat (F.), Chabrol (E.), Debré (R.), Fey (B.), Galliard (H.), Gastinel (P.), Halphen (E.), Hazard (R.), Heuyer (G.), Lantuejoul (P.), Laroche (G.), Lavier (G.), Lévy-Solal (E.), Lian (C.), Mathieu (P.), Mocquot (P.), Monod (R.), Moreau (R.), Moulonguet (P.), Mouquin (M.), Olivier (E.), Pasteur Valléry-Radot, Petit-Dutaillis (D.), Piédelièvre (R.), Quénu (J.), Richet (C.), Senèque (J.), Strohl (A.), Tanon (L.), Verne (J.).

DOYEN Léon BINET.

Membre de l'Institut

1^{er} ASSESSEUR } Gaston CORDIER
2^e ASSESSEUR } Paul CASTAIGNE

I. — PROFESSEURS

1^o CHAIRES DE SCIENCES FONDAMENTALES

a) Professeurs titulaires :

	MM.
Anatomie	DELMAS (A.)
Anatomie pathologique	DELARUE (J.)
Anesthésiologie	BAUMANN (J.)
Biochimie médicale	{ JAYLE (M.-F.) SCHAPIRA (G.)
Biologie appliquée à l'Education physique et aux Sports	CHAILLEY-BERT (P.)
Biologie médicale	FAUVERT (R.)
Cancérologie médicale et sociale	BERNARD (J.)
Embryologie	TUCHMANN (H.)
Histoire de la médecine et de la chirurgie (Lariboisière)	JOANNON (P.)
Histologie	GIROUD (A.)
Hygiène et médecine préventive	BOYER (J.)
Médecine du Travail	DESOILLE (H.)
Médecine légale	DEROBERT (L.)
Microbiologie (Bactériologie et virologie)	FASQUELLE (R.)
Parasitologie	BRUMPT (L.-C.)
Pathologie chirurgicale	LAURENCE (G.)
Pathologie exotique	N...
Pathologie expérimentale et comparée	MERKLEN (F.-P.)
Pathologie médicale	N...
Pathologie respiratoire	TURIAF (J.)
Pathologie et thérapeutique générales	BOUDIN (G.)
Pharmacologie	CHEYMOL (J.)
Physiologie	{ BINET (L.) BARGETON (D.)
Physiologie et pathologie obstétricale	LEPAGE (F.)
Physique médicale	{ DOGNON (A.) DJOURNO (A.)
Radiologie médicale	DESGREZ (H.)
Technique chirurgicale et Chirurgie expérimentale	CAUCHOIX (J.)
Thérapeutique	CONTE (M.)
Thérapeutique appliquée	LAMOTTE (M.)

b) Professeurs à titre personnel :

Biochimie médicale	{ DESGREZ (P.) POLONOVSKI (J.)
Biologie médicale	BOURLIÈRE (F.)
Hygiène et médecine préventive	DEPARIS (M.)
Pharmacologie	LÉVY (M ^{lle} J.)
Physiologie	PARROT (J.)
Physique médicale	KELLERSHOHN (L.)

2° CHAIRES DE SCIENCES CLINIQUES

a) Professeurs titulaires :

	MM.
Clinique carcinologique chirurgicale (Necker)	REDON (H.)
Clinique cardiologique (Broussais)	SOULIÉ (P.)
Cliniques chirurgicales	Beaujon LORTAT-JACOB (J.-L.)
	Cochin LEGER (L.)
	Cochin ABOULKER (P.)
	Hôtel-Dieu PATEL (J.)
	Pitié CORDIER (G.)
	Saint-Antoine GOSSET (J.)
	Salpêtrière SICARD (A.)
	Tenon OLIVIER (Cl.)
Clinique de chirurgie infantile et orthopédique (Enfants-Malades)	FÈVRE (M.)
Clinique chirurgicale orthopédique et traumatologique (Cochin)	MERLE d'AUBIGNÉ (R.)
Clinique de chirurgie cardio-vasculaire (Broussais)	GAUDART d'ALLAINES (F. de)
Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire (Laennec)	MATHEY (J.)
Clinique endocrinologique (Pitié)	DECOURT (J.)
Clinique de Génétique médicale (Enfants-Malades)	LAMY (M.)
Clinique gynécologique (Broca)	HUGUIER (J.)
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques (Saint-Louis)	DEGOS (R.)
Clinique des maladies des Enfants (Enfants-Malades)	CATHALA (J.)
Clinique des maladies infectieuses (Claude-Bernard)	MOLLARET (P.)
Clinique des maladies mentales et de l'encéphale (Sainte-Anne)	DELAY (J.)
Clinique des maladies métaboliques (Necker)	HAMBURGER (J.)
Clinique des maladies du sang (Broussais)	MARCHAL (G.)
Clinique des maladies du système nerveux (Salpêtrière)	CASTAIGNE (P.)
Cliniques médicales	Boucicaut MILLIEZ (P.)
	Broussais LENÈGRE (J.)
	Cochin JUSTIN-BESANÇON (L.)
	Cochin BROUET (G.)
	Hôtel-Dieu BARIÉTY (M.)
	Lariboisière SÈZE (S. de)
	Pitié DREYFUS (G.)
	Saint-Antoine KOURILSKY (R.)
Clinique d'hydrologie et de climatologie (Richat)	DEBRAY (C.)
Clinique médicale propédeutique (Broussais)	GENNES (L. de)
Clinique médico-sociale du diabète sucré et des maladies de la nutrition (Hôtel-Dieu)	DEROT (M.)
Clinique de neuro-chirurgie (Pitié)	DAVID (M.)
Clinique neurologique (Salpêtrière)	GARCIN (R.)
Cliniques obstétricales	Baudelocque LACOMME (M.)
	Foch (Suresnes) MERGER (R.)
Clinique obstétricale et gynécologique (Port-Royal)	VARANGOT (J.)
Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu)	RENARD (G.)
Clinique oto-rhino-laryngologique (Lariboisière)	AUBRY (M.)
Clinique de pédiatrie et de puériculture (Saint-Vincent-de-Paul)	LELONG (M.)
Clinique de pédiatrie sociale (Enfants-Malades)	MARIE (J.)
Clinique de pneumo-phthisiologie (Laennec)	BERNARD (E.)
Clinique de neuro-psychiatrie infantile (Salpêtrière)	MICHAUX (L.)
Clinique de rhumatologie médicale et sociale (Cochin)	COSTE (F.)
Clinique stomatologique (Pitié)	DECHAUME (M.)
Clinique thérapeutique chirurgicale (Vaugirard)	ROUX (M.)
Clinique thérapeutique médicale (Saint-Antoine)	LEMAIRE (A.)
Clinique toxicologique	GAULTIER (M.)
Clinique chirurgicale orthopédique et traumatologique	PADOVANI (P.)
Séméiologie médicale	DOMART (A.)
Séméiologie et clinique chirurgicales	POILLEUX (F.)
Clinique urologique (Necker)	COUVELAIRE (R.)
Hygiène et clinique de la première enfance (Trousseau)	TURPIN (R.)

b) Professeurs à titre personnel :

Médecine	BOUR (H.)
	LHERMITTE (F.)
	PEQUIGNOT (H.)

II. — PROFESSEURS SANS CHAIRE, PROFESSEURS AGRÉGÉS ET MAÎTRES DE CONFÉRENCES - AGRÉGÉS

	MM.
Anatomie	CABROL (C.) COUINAUD (C.) GILLOT (C.) OLIVIER (G.) pr. s. ch. CAUTHIER-VILLARS (Mlle P.) pr. s. ch.
Anatomie pathologique	ABELANET (R.) CHOMETTE (G.) GOUYGOU (Ch.), m. conf. NEZELOFF (Ch.) ORCEL (L.) PAILLAS (J.)
Anesthésiologie	KERN (E.) VOURC'H (G.) BARBIER (P.) pr. s. ch.
Bactériologie	CHRISTOL (D.) LE MINOR (L.) TOURNIER (P.) BAGLIEU Et. m. conf.
Biochimie médicale	BOURILLON (R.) CARTIER (P.) DREYFUS (J.-Cl.) GONNARD (P.) KRUM (J.) JEROME (H.)
Biologie appliquée à l'Éducation Physique et aux Sports	PLAS (F.)
Carcinologie	BOIRON (M.) DENOIX (P.) MATHE (G.) SELIGMANN (M.)
Dermato-Syphiligraphie	CIVATTE (J.) DUPERRAT (B.)
Electro-Radiologie	LEDOUX-LEBARD (G.) BESSIS (M.) BILSKI-PASQUIER (G.)
Hématologie	DAUSSET (J.) DUHAMEL (G.) COUJARD (R.), pr. s. ch.
Histologie	MAROIS (M.) RACADOT (J.)
Hydrologie	BESANÇON (F.) CORNET (A.)
Hygiène	BOYER (J.) pr. s. ch. BLANCHER (G.) CORRE-HURST (Mme L.) SAPIN-JALOUSTRE (H.)
Maladies infectieuses	BASTIN (R.) Pr. s. ch. DUPONT (V.)
Médecine légale	FOURNIER (E.) GUENIOT (M.) HADENGUE (A.)
Médecine du travail	ALBAHARY (C.)
Neuro-chirurgie	PERTUISSET (B.)
Neurologie	LAPRESLE (J.) GRANJON (A.) HERVET (E.) LE LORIER (G.) LEVY (J.)
Obstétrique	MORIN (P.) MUSSET (R.) ROBEY (M.) SENEZE (J.) SUREAU (G.) THOYER-ROZAT (J.)
Ophtalmologie	BRÉGEAT (P.) DUBOIS (A.) SARAUX (H.)

	MM.
Orthopédie	JUDET (R.) MEARY (R.) POSTEL (M.) RAMADIER (J.)
Oto-rhino-Laryngologie	DEBAIN (J.) PIALOUX (P.)
Parasitologie	GOLVAN (Y.) LAPIERRE (J.)
Pathologie chirurgicale	BARCAT (J.) BINET (J.-P.) CERBONNET (G.) CHATELIN (C.-L.) DUBOST (Ch.) DUBOST (Cl.) FAUREL (J.) FLABEAU (F.) GARBY (M.) GARNIER (H.) (Cl. de) GAUDART-d'ALLAINES GERMAIN (A.) LATASTE (J.) LOYGUE (J.) MERCADIER (M.) NATALI (J.) PELLERIN (D.) PERROTIN (J.) ROBERT (H.) THOMERET (G.)
Pathologie exotique	SCHNEIDER (J.)
Pathologie expérimentale	BENHAMOU (J.-P.) BERTHAUX (P.) BOIVIN (P.) CROSNIER (J.) HARTMANN (L.) LÉPER (J.) Pr. s. ch. MAURICE (J.) MIKOL (Cl.) RICHEL (G.) AUSSANNAIRE (M.) BOUVIER (J.) BOUVRAIN (Y.) BRICAIRE (H.) BRISAUD (H.) BROCARD (H.) BUGE (A.) CATINAT (J.) CHRÉTIEN (J.) GOBLENTZ (B.) CONTAMIN (F.) COURY (C.) ÉTIENNE (J.-P.) FREZAL (J.) FRITEL (D.) HENNEQUET (A.) HIMBERT (J.) HOUSSET (E.) LAROUCHE (Cl.) LESOBRE (R.) LEVEQUE (B.) MACREZ (G.) MOREAU (L.) NICK (J.) ROYER (P.) TOURNEUR (R.) WOLFROMM (R.)
Pathologie médicale	LAFOURCADE (J.) LÉPERQ (G.) MANDE (R.) KOZZICONACCI (P.) POLONOVSKI (C.) ROSSIER (A.) VIALATTE (J.)
Pédiatrie-Puériculture	

	MM.		MM.
Pharmacologie	{ BOISSIER (J.) LECHAT (P.)	Psychiatrie	PICHOT (P.)
	{ BARRES (G.) DEJOURS (P.)	Psychiatrie infantile	{ DENIKER (P.) DUCHE (D.) FLAVIGNY (H.)
Physiologie	{ pr. s. ch. DURAND (J.) GIRARD m. conf. HUGELIN (A.) SCHERRER (J.) CHANTEUR (J.) GUGEROT (L.), m. conf.	Rhumatologie	DELBARRE (F.) pr. s. ch.
	{ pr. s. ch. GREMY (F.) m. conf. MILHAUD (G.) PELLERIN (P.) ROUCAYROL (J.-Cl) TUBIANA (M.) m. conf.	Stomatologie	{ CERNEA (P.) CHAPUT (M ^{me} A.) m. c. agr. GRELLET (M.)
Physique médicale	{ KREIS (B.) MEYER (A.) RENAULT (P.)	Thérapeutique	{ CHASSAGNE (P.) MARCHE (J.)
Pneumo phtisiologie		Urologie	{ AUVERT (J.) MOULONGUET (A.) QUENU (L.)

III. — PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGRÉGÉS CHARGÉS DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE à titre permanent.

	MM.		MM.
Anatomie	DEBEYRE (J.)	Clinique ophtalmologique	{ DESVIGNES (P.) OFFRET (G.)
Clinique chirurgicale	VERNE (J.-M.)	Clinique pédiatrique et pué- riculture	LAPLANE (R.)
Clinique médicale	{ PERRAULT (M.) RAMBERT (P.) THIEFFRY (S.)	Clinique psychiatrique	BARUK (H.)
Clinique obstétricale	{ GRASSET (J.) MAYER (M.)	Clinique urologique	KUSS (R.)

IV. — PROFESSEURS DÉTACHÉS DANS LES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

Bactériologie	HAUDUROY (P.) Pr. s. ch.
Pathologie chirurgicale	RUDLER (J.) Pr. s. ch.

V. - CHARGÉS DE COURS D'HYGIÈNE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Secrétaire général de la Faculté	M. LENA (J.)	{ BOLTANSKI (E.) LAUNAY (C.)
Secrétaire principal	Mlle CHAINTREUIL (G.)	
Conservateur en Chef de la Bibliothèque		
Conservateur du Musée d'Histoire de la Médecine	{ M. le Docteur HAHN (A.)	
Conservateurs	Mlles DUMAITRE (P.), LE NOIR (G.), QUIÉVREUX (E.)	
Bibl'othécaire	{ Mmes CONTET (J.), FORGET (F.), Mlle LAURENT (H.)	

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A mes Parents

qui m'ont servi d'exemple et chez qui
j'ai toujours trouvé aide et réconfort.

A Monsieur le Professeur JULIEN - MARIE,

En témoignage de notre respectueuse
reconnaissance pour l'honneur qu'il
nous a fait en acceptant de présider
cette thèse.

A notre Maître

Monsieur le Professeur DUROUX

à qui nous devons d'avoir compris le
véritable rôle du médecin, et dont nous
nous efforcerons de suivre l'enseigne-
ment.

A Monsieur le Docteur SEGUIN

Monsieur le Docteur HAMEL

Médecins-Chefs de l'Hôpital de
Mantes-la-Jolie (Seine-&-Oise)

I N T R O D U C T I O N

Les diarrhées aiguës constituent la manifestation clinique majeure de divers états morbides dont l'ensemble est une des principales causes de mortalité au cours de la première enfance.

Le traitement des diarrhées aiguës consiste essentiellement dans la correction des désordres hydro-électriques et dans la thérapeutique anti-infectieuse. Cependant, surtout dans les jours suivants l'état aigu, la diététique garde une importance considérable.

Il semble que la réalimentation des diarrhées aiguës soit maintenant bien classique ; il nous a paru cependant utile de rechercher comment, dans un service de pédiatrie, se réalisait en pratique cette réalimentation.

Nous rappellerons donc tout d'abord le schéma classique : pendant les premières heures, on utilise les solutés électrolytiques hypotoniques. Puis on emploie la soupe de carottes jusqu'à disparition de la diarrhée ; on ajoute alors progressivement à la préparation de carottes des quantités croissantes de babeurre.

Après une dizaine de jours, le babeurre est remplacé par un lait sec demi-écrémé. On revient enfin très progressivement à l'alimentation normale adaptée à l'âge.

Nous avons donc repris les cent derniers dossiers d'enfants entrés dans le service pour une diarrhée aiguë.

Leur examen montre que, parmi ces 100 cas nous avons :

- 50 garçons et 50 filles.

- . 12 enfants de moins de 2 mois ;
- . 32 enfants entre 2 et 6 mois ;
- . 34 enfants entre 6 et 12 mois ;
- . 22 enfants entre 12 et 24 mois.

Nous avons systématiquement conservé à l'enfant, au cours de la réalimentation, le lait auquel il était habitué, mais nous nous sommes efforcés de lui donner ou de lui rendre les quantités souhaitables pour son poids et son âge.

-:-:-:-:-

1° cas : Françoise S. - 4 mois $\frac{1}{2}$.

Poids à l'arrivée : 6.400 g.

Régime habituel : 6 biberons 140 g. lait Neslé.

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de soupe de carottes et 9 mesures de farine. Le nombre de selles diminuant, on ajoute le 3° jour 100 g. de babeurre. Le 4° jour, elle reçoit 300 g. de babeurre, 500 g. de carottes et 10 mesures de farine, qu'elle supporte très bien ; le 5° jour, 500 g. de babeurre ; le 6° jour, on remplace 100 g. de babeurre par 100 g. de Galliacid et on assiste à une reprise de la diarrhée qui amène à revenir en arrière et à redonner le 7° jour 800 g. de carottes avec 10 mesures de farine. Du 8° au 12° jour, on introduit chaque jour 100 g. de babeurre, arrivant au 13° jour à 500 g. de babeurre, 300 g. de carottes et 10 mesures de farine. Du 14° au 18° jour, on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait Gloria, sans reprise de la diarrhée. L'enfant a donc à ce moment un régime normal : 6 biberons de 140 g. avec 500 g. de lait, 10 mesures de farine et 340 g. de soupe de carottes. Elle pèse alors 7.300 g. (gain de 900 g.).

Coproculture : 0

Otite : ++

- Réalimentation difficile : l'introduction de lait au 6° jour entraîne une reprise de la diarrhée et oblige à reprendre le régime de carottes.

2° cas : Andrée B. - 11 mois.

Poids à l'entrée : 7.500 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Le premier jour, l'enfant reçoit 4 repas constitués chacun de 200 g. de soupe de carottes + 4 mesures de farine. Le 2° jour, on introduit 200 g. de lait. L'enfant décède ce jour-là d'un collapsus cardio-vasculaire, bien qu'il ait repris 400 g. en 36 heures.

3° cas : Daniel F. - 4 mois $\frac{1}{2}$.

Poids à l'entrée : 5.300 g.

Régime habituel : 5 biberons de 130 g. de lait Gloria + 1 mesure de farine.

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 6 biberons de 140 g. de soupe de carottes + 10 mesures de farine. Le 3^o jour, on remplace 200 g. de carottes par 200 g. de babeurre ; le 4^o jour, il reçoit 400 g. de babeurre, et 500 g. le 5^o jour. Du 6^o au 10^o jour, on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait Gloria, de sorte qu'il a au 10^o jour : 500 g. de lait, 340 g. de carottes et 12 mesures de farine. La réalimentation a été bien supportée.

Au 13^o jour, une nouvelle poussée otitique entraîne une rechute de la diarrhée. Les 14, 15 et 16^o jours, il reçoit 840 g. de carottes et 11 mesures de farine. Du 17^o au 21^o jour, on remplace chaque jour 100 g. de carottes par 100 g. de babeurre ; du 22^o au 25^o jour, on remplace 100 g. de babeurre par 100 g. de lait S.M.A.

Au 25^o jour, il a donc : 300 g. de lait S.M.A., 200 g. de babeurre, 340 g. de carottes et 11 mesures de farine. Une rechute de la diarrhée fait maintenir ce régime pendant cinq jours et ce n'est qu'au 30^o jour que l'on passe à 400 g. de lait, maintenus pendant 5 jours avant d'obtenir le régime normal, au 35^o jour : 6 biberons de 140 g. avec 11 mesures de farine et 340 g. de carottes.

Le poids est alors de 5.600 g. (gain de 300g.)

- Réalimentation facile au départ, mais une rechute diarrhéique est beaucoup plus difficile à juguler et cette réalimentation se fait très lentement avec des rechutes . On parvient pourtant à un régime normal au 35^o jour.

4^o cas : Pascal L. - 11 mois.

Poids à l'entrée : 8.600 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de soupe de carottes et 15 mesures de farine. Le 4^o jour, on introduit 200 g. de babeurre et 400 g. le 5^o jour. Au 6^o jour, il reçoit 400 g. de babeurre, 100 g. de lait Gloria, 300 g. de carottes et 15 mesures de farine. Du 7^o au 10^o jour, on augmente de 100 g. de lait par jour et au 13^o jour, on passe à 5 repas contenant 350 g. de lait, régime que l'enfant supporte sans rechute. Il pèse alors 9.300 g., soit un gain de 700 g.

- Réalimentation rapide et sans incident.

5° cas : Brigitte C. - 4 mois $\frac{1}{2}$.

Poids à l'entrée : 5.700 g.

Régime habituel : 6 biberons de 140 g. de lait de vache.

Les trois premiers jours, 800 g. de carottes et 8 mesures de farine. Du 3° au 6° jour, on introduit chaque jour 100 g. de babeurre. Au 7° jour : 400 g. de babeurre, 100 g. de lait de vache, 300 g. de carottes et 8 mesures de farine. Du 8° au 11° jour, on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait. Au 11° jour, régime normal : 500 g. de lait, 8 mesures de farine, 300 g. de carottes. Elle pèse alors 6.400 g. (gain de 700 g.) et sort du service au 17° jour.

Revient 10 jours plus tard dans un état toxique. Poids : 5.600 g. Les deux premiers jours, elle reçoit 780 g. de carottes et 5 M.F., les 4, 5 et 6° jours, 480 g de carotte, 300 g. de babeurre et 7 M.F. ; les 7° et 8° jours, 500 g. de babeurre. Les 9° et 10° jours, 200 g. de lait, du 11° au 20° jour, 300 g. de lait et 8 M.F. Les 20° et 21° jours, 400 g. de lait et enfin au 22° jour on arrive au régime normal : 500 g. de lait, 300 g. de carottes et 8 M.F., régime que l'enfant supporte sans autre incident. Poids 6.000 g., elle a repris 400 g. mais est encore au-dessous du poids qu'elle avait lors de son premier séjour.

- Cette enfant a donc présenté une première diarrhée qui a très bien cédé au traitement et permis une réalimentation rapide. Elle quitte le service après un séjour de 17 jours, mais revient 10 jours après avec une diarrhée qui a été beaucoup plus longue à céder et nous a obligés à de fréquents arrêts dans la réalimentation. A signaler une otorrhée purulente.

6° cas : Rosanna R. - 6 semaines.

Poids à l'entrée : 3.650 g.

Régime habituel : 6 biberons de 120 g. de lait Neslé.

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 6 biberons de 120 g. de soupe de carottes et 3 M.F. Du 3° au 5° jour, on donne chaque jour 100 g. de plus de babeurre (500 g. au 5° jour), puis du 6° au 10° jour, on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait Neslé, arrivant ainsi au 10° jour au régime normal, 500 g. de lait, 4 M.F. et 120 g. de carottes. Le poids est alors de 4.100 g. (gain de 450 g.). La coproculture avait mis en évidence des colibacilles

pathogènes du groupe 111 B 4.

- Réalimentation facile, sans rechute.

7° cas : Michel H. - 7 semaines.

Poids à l'entrée : 4.600 g.

Régime habituel : 6 biberons 120 g. Gallia vert + 3 M.F.

Le premier jour, l'enfant reçoit 6 biberons de 120 g. de carottes et 4 mesures de farine. Du 2° au 6° jour, on introduit chaque jour 100 g. de babeurre. Le 7° jour, les selles ont une consistance un peu liquide et amènent à maintenir le même régime pendant 3 jours. Puis du 10° au 14° jour, on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait Gallia bleu. La quantité de farine passe à 5 mesures. Au 14° jour, régime normal : 500 g. de lait, 220 g. de carottes et 5 M.F. Le poids est de 5.600 g. (gain de 1.200 g.). La coproculture avait montré des colibacilles pathogènes du groupe 111 B 4.

- Réalimentation facile, petite rechute au 7° jour qui cède en maintenant le même régime.

8° cas : Nathalie M. - 12 mois.

Poids à l'entrée : 7.800 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de soupe de carottes et 10 mesures de farine. Le 3° jour, 100 g. de babeurre et le 4° jour 300 g. Le 5° jour, elle a 300 g. de babeurre et 100 g. de lait Guigoz. Du 6° au 9° jour, on ajoute 100 g. de lait par jour, pour obtenir 500 g. au 9° jour. Le 15° jour, on passe à 5 repas, puis à 4 repas variés une semaine plus tard. Le poids est alors de 8.000 g. (gain 200 g.).

- Réalimentation facile et sans incident.

9° cas : Liliane L. - 6 mois.

Poids à l'entrée : 5.600 g.

Régime habituel : 5 repas.

Le premier jour, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 14 mesure de farine. Du 2° au 6° jour, 4 repas sans lait. Le 7° jour, on introduit 100 g. de lait. Du 7° au 17° jour, les selles sont toujours nombreuses et l'enfant vomit à chaque repas. Du 17° au 20° jour, elle est à nouveau à 4 repas sans lait. En l'absence d'amélioration, on lui donne des repas de Vegelact sans lait, régime qu'elle supporte bien. Poids : 5.800 g. (gain de 200 g.). La coproculture avait montré des colibacilles pathogènes du groupe 111 B 4.

- Réalimentation très difficile ; après plusieurs essais infructueux l'enfant est mise au Vegelact.

10° cas : Christine B. - 7 mois.

Poids à l'entrée : 5.800 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes + 14 mesures de farine. On introduit dans son régime 200 g. de babeurre le 3° jour et 400 g. le 4° jour. Le 5° jour, elle reçoit 400 g. de babeurre et 100 g. de lait de vache, puis on augmente le lait de 100 g. par jour jusqu'au 9° jour où elle reçoit 500 g. de lait, 300 g. de carottes et 14 M.F. Au 16° jour, elle passe à 5 repas : 350 g. de lait + 14 M.F.

Poids 7.000 g. (gain de 1.200 g.).

- Réalimentation rapide, sans incident.

11° cas : Patrice T. - 3 mois.

Poids à l'entrée : 5.000 g.

Régime habituel : 6 biberons de 140 g. lait Prodiétain.

Le premier jour, l'enfant reçoit 720 g. de soupe de carottes + 6 M.F., puis on introduit chaque jour 100 g. de babeurre : au 6° jour, elle reçoit donc 500 g. de babeurre et l'on remplace alors chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait Guigoz. Au 11° jour, elle est à un régime normal : 500 g. de lait + 180 g. de carottes + 6 M.F. Son poids est de 5.200 g. (gain de 200 g.). La coproculture avait montré la présence de colibacilles pathogènes de tous les groupes testés.

- Réalimentation normale, sans incident.

12° cas : Bruno L. - 5 mois.

Poids à l'entrée : 6.500 g.

Régime habituel : 5 repas lait S.M.A.

Le premier jour, l'enfant reçoit 800 g. de carottes + 10 M.F. Les 2°, 3° et 4° jours, il reçoit 200 g. de babeurre. Devant la persistance des troubles digestifs, on lui donne le 5° jour 4 biberons de bouillon de légumes et une bouillie sans lait. Même régime le 6° jour. Puis on ajoute 100 g. de lait par jour jusqu'au 9° jour, on passe alors à 5 repas dont 350 g. de lait et 2 bouillies. Son poids est alors de 6.800 g. (gain de 300 g.).

- Réalimentation difficile, le babeurre est mal supporté et doit être remplacé par des légumes et des bouillies sans lait. On arrive pourtant à rétablir progressivement un régime normal.

13° cas : Nelly F. - 14 mois.

Poids à l'entrée : 9.700 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes + 16 M.F. Les selles sont redevenues normales et permettent de passer à 4 repas sans lait au 4° jour. On introduit ensuite 100 g. de lait par jour pour arriver au 7° jour à donner 4 repas normaux. Le poids est alors de 9.900 (+ 200 g.).

- Réalimentation simple et sans incident.

14° cas : Maurice D. - 6 mois.

Poids à l'entrée : 6.500 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Le premier jour, l'enfant reçoit 800 g. de carottes, puis on passe à 4 repas sans lait, que l'on maintient plusieurs jours. A partir du 7° jour, on introduit 100 g. de lait par jour pour atteindre au 10° jour 4 repas normaux. La coproculture avait montré des colibacilles pathogènes des groupes 119 B 14 et 126 B 16.

- Réalimentation simple, après être resté cinq jours sans lait, la diarrhée persistant.

15° cas : Patrick V. - 7 mois.

Poids à l'entrée : 7.900 g.

Régime habituel : 4 repas de 860 g. de lait / jour + 16 M.F.

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 14 mesures de farine. Puis on introduit chaque jour 100 g. de lait, pour arriver au 8° jour à 500 g. de lait. On passe ensuite à 4 repas avec 500 g. de lait. Il pèse alors 8.100 g. (gain de 100 g.).

- réalimentation facile et rapide, sans incident.

16° cas : Bernard C. - 7 mois.

Poids à l'entrée : 7.000 g.

Régime habituel : 4 repas de lait (560 g. lait de vache + Gallia)

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 16 M.F. Puis on introduit 100 g. de lait par jour et au 8° jour, on arrive à 4 repas avec 500 g. de lait. Il pèse alors 7.500 g. (gain de 500 g.). La coproculture ne montre que des colibacilles non pathogènes.

- Réalimentation facile et rapide.

17° cas : Xavier M. - 9 mois.

Poids à l'entrée : 8.900 g.

Régime habituel : 4 repas avec 300 g. de lait / jour.

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 16 M.F. Puis on introduit 100 g. de lait par jour jusqu'au 6° jour où on peut adopter le régime normal : 4 repas avec 350 g. de lait. Il pèse alors 8.700 g. (perte de 200 g.). La coproculture n'a montré que des colibacilles non pathogènes.

- Réalimentation rapide et sans incident.

18° cas : Aline L. - 5 mois.

Poids à l'entrée : 5.650 g.

Régime habituel : 5 biberons de 160 g. ; 650 g. de lait de vache.

Le premier jour, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 16 mesures de farine, puis on ajoute 100 g. de lait par jour, jusqu'au 6^o jour où elle reçoit 500 g. de lait et 300 g. de carottes + 16 mesures de farine. Trois jours après, on peut la mettre à 5 repas. Son poids est alors de 6.200 g., elle a grossi de 650 g.

- Réalimentation rapide et sans incident.

19^o cas : Patricia M. - 5 mois.

Poids à l'entrée : 7.450 g.

Régime habituel : 6 biberons de 120 g. lait Pélargon + 4 M.F.

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 12 mesures de farine. Le 4^o jour, l'adjonction de 200 g. de babeurre est très bien supportée et permet au 5^o jour de donner 200 g. de babeurre et 100 g. de lait, le 6^o jour, 200 g. de babeurre et 200 g. de lait ; le 7^o jour, 100 g. de babeurre et 400 g. de lait ; le 8^o jour, 500 g. de lait. Ce régime est maintenu 3 jours ; puis on passe à 5 repas. Le poids est alors de 8.200 g. avec un gain de 750 g. La coproculture avait montré des colibacilles pathogènes des groupes 111 B 4 et 55 B 5.

- Réalimentation rapide et sans incident.

20^o cas : Patrick J. - 13 mois.

Poids à l'entrée : 10.200 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les trois premiers jours, l'enfant est mis à un régime comportant 4 repas sans lait ; puis on ajoute chaque jour 100 g. de lait à ce régime et au 7^o jour, il peut supporter le régime normal de 4 repas avec 350 g. de lait. Son poids est alors de 10.700 g. (Il a grossi de 500 g.).

- Réalimentation rapide et sans incident.

21^o cas : Marie-Line M. - 8 mois.

Poids à l'entrée : 7.500 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les cinq premiers jours, l'enfant reste à un régime comprenant 800 g. de carottes et 15 mesures de farine. Le 6^o jour, on passe à 4 repas sans lait. Le 10^o jour seulement, on introduit 100 g. de lait. Même régime les deux jours suivants, puis le 13^o jour, on peut donner 300 g. de lait et au 14^o jour, l'enfant est au régime normal. Il pèse alors 7.600 g. (gain de 100g.). La coproculture avait montré des levures et des proteus.

- Réalimentation très lente puisque ce n'est qu'au 6^o jour que l'on a pu abandonner la carotte et au 10^o jour que le lait a pu être réintroduit progressivement. Pas de nouvelle rechute.

22^o cas : Béatrice L. - 3 mois.

Poids à l'entrée : 4.200 g.

Régime habituel : 6 biberons de 105 g. de Gallia bleu.

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 5 mesures de farine. On ajoute 100 g. de babeurre au 3^o jour, 300 g. au 4^o jour, 500 g. au 5^o jour. On remplace le babeurre par le lait, progressivement, et le 9^o jour, l'enfant est à un régime normal, comprenant 500 g. de lait Gallia et 7 mesures de farine, la quantité de liquide étant complétée par la soupe de carottes. Elle pèse alors 4.700 g. (gain de 500 g.).

- Réalimentation rapide, sans incident.

23^o cas : Ourda L. - 10 mois.

Poids à l'entrée : 8.000 g.

Régime habituel : 4 biberons de 200 g. de lait.

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 14 mesures de farine. Le 4^o jour, on passe à 4 repas sans lait, le 6^o jour, on ajoute 100 g. de lait, le 7^o jour, 200 g. et le 8^o jour, 4 repas normaux avec 350 g. de lait.

- Réalimentation rapide, d'autant plus que l'enfant est entrée avec un régime lacté pur et qu'elle est passée à 4 repas variés en 8 jours.

Aucun incident.

Les cinq premiers jours, l'enfant reste à un régime comprenant 800 g. de carottes et 15 mesures de farine. Le 6° jour, on passe à 4 repas sans lait. Le 10° jour seulement, on introduit 100 g. de lait. Même régime les deux jours suivants, puis le 13° jour, on peut donner 300 g. de lait et au 14° jour, l'enfant est au régime normal. Il pèse alors 7.600 g. (gain de 100g.). La coproculture avait montré des levures et des proteus.

- Réalimentation très lente puisque ce n'est qu'au 6° jour que l'on a pu abandonner la carotte et au 10° jour que le lait a pu être réintroduit progressivement. Pas de nouvelle rechute.

22° cas : Béatrice L. - 3 mois.

Poids à l'entrée : 4.200 g.

Régime habituel : 6 biberons de 105 g. de Gallia bleu.

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 5 mesures de farine. On ajoute 100 g. de babeurre au 3° jour, 300 g. au 4° jour, 500 g. au 5° jour. On remplace le babeurre par le lait, progressivement, et le 9° jour, l'enfant est à un régime normal, comprenant 500 g. de lait Gallia et 7 mesures de farine, la quantité de liquide étant complétée par la soupe de carottes. Elle pèse alors 4.700 g. (gain de 500 g.).

- Réalimentation rapide, sans incident.

23° cas : Ourda L. - 10 mois.

Poids à l'entrée : 8.000 g.

Régime habituel : 4 biberons de 200 g. de lait.

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 14 mesures de farine. Le 4° jour, on passe à 4 repas sans lait, le 6° jour, on ajoute 100 g. de lait, le 7° jour, 200 g. et le 8° jour, 4 repas normaux avec 350 g. de lait.

- Réalimentation rapide, d'autant plus que l'enfant est entrée avec un régime lacté pur et qu'elle est passée à 4 repas variés en 8 jours.

Aucun incident.

24° cas : Carole J. - 13 mois.

Poids à l'entrée : 8.200 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Le premier jour, l'enfant reçoit 4 repas sans lait ; puis on ajoute 100 g. de lait par jour, jusqu'au 4° jour où elle est à un régime normal qu'elle supporte très bien.

- Réalimentation rapide, sans incident.

25° cas : Louisa R. - 13 mois.

Poids à l'entrée : 8.500 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Pendant cinq jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 16 M.F. Au 6° jour, on passe à 4 repas sans lait. Le 9° jour, on commence à ajouter 100 g. de lait par jour jusqu'au 12° jour où l'enfant est au régime normal. Elle pèse alors 8.800 g. (gain de 300 g.). La coproculture avait montré des colibacilles pathogènes du groupe 111 B 4.

- Réalimentation très progressive puisque l'enfant est restée 5 jours à la carotte seule et que ce n'est qu'au 9° jour que le lait a été introduit au régime.

26° cas : Louisa A. - 4 mois.

Poids à l'entrée : 5.900 g.

Régime habituel : 5 biberons de 120 g. de lait de vache + 3 M.F.

Les quatre premiers jours, l'enfant est mise à 5 repas : 350 g. de lait et 2 bouillies (14 M.F.). La diarrhée ne cédant pas au traitement et à la diminution du lait, elle reçoit au 5° jour, 800 g. de carottes et 14 M.F. Au 9° jour, on commence à introduire 100 g. de babeurre par jour, puis au 14° jour, on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait, jusqu'au 18° jour où elle reçoit 500 g. de lait et 14 M.F. Au 28° jour, on passe à 5 repas. L'enfant pèse alors 6.250 g. (gain de 350 g.).

- Réalimentation très lente, surtout en raison des difficultés au départ, pas de rechute.

27° cas : Olivier P. - 3 mois.

Poids à l'entrée : 4.700 g.

Régime habituel : 5 repas dont 300 g. de lait Neslé.

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 720 g. de carottes et 6 M.F. le 3° jour, on ajoute 200 g. de babeurre, le 4° jour, 400 g., le 5° jour, 400 g. de babeurre et 100 g. de lait, puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait, jusqu'au 9° jour où l'enfant est au régime normal : 500 g. de lait et 7 M.F. Il pèse alors 5.400 g. (gain de 700 g.).

- Réalimentation rapide et sans incident.

28° cas : Catherine B. - 5 mois $\frac{1}{2}$.

Poids à l'entrée : 5.900 g.

Régime habituel : 6 biberons 160 g. lait Alété + 11 M.F.

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 10 mesures de farine ; on introduit 200 g. de babeurre le 3° jour et 400 g. le 4° jour, le 5° jour, elle reçoit 500 g. de babeurre, 300 g. de carottes et 11 mesures de farine. Puis on remplace chaque jour, 100 g. de babeurre par 100 g. de lait jusqu'au 12° jour où l'enfant a un régime normal : 500 g. de lait Alété, 300 g. de carottes et 11 M.F.

Son poids est alors de 6.600 g. (Gain de 700 g.). La coproculture avait montré des colibacilles pathogènes des groupes 26 B 6, 12 B 12, 115 B 15.

- Réalimentation rapide, sans incident.

29° cas : Béatrice D. - 4 mois.

Poids à l'entrée : 4.900 G.

Régime habituel : 6 biberons de 120 g. lait Alété

Le premier jour, l'enfant reçoit 780 g. de carottes et 8 M.F. ; les jours suivants, on introduit 100, 200, 400 g. de babeurre, puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait jusqu'au 10° jour où l'enfant a un régime normal : 500 g. de lait Alété, 8 mesures de farine et 280 g. de carottes. Son poids est alors de 5.400 g. (gain de 500 g.). La coproculture avait montré

des colibacilles pathogènes du groupe 127 B 8.

- Réalimentation rapide, sans incident.

30° cas : Richard P. - 20 mois.

Poids à l'entrée : 10.000 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Le premier jour, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 14 M.F. ; les deux jours suivants 4 repas sans lait, puis on ajoute 100 g. de lait par jour, de sorte qu'au 9° jour l'enfant peut supporter 4 repas normaux. Son poids est alors de 10.200 g. (gain de 200 g.).

- Réalimentation rapide, sans incident.

31° cas : Evelyne C. - 8 mois.

Poids à l'entrée : 7.700 g.

Régime habituel : 4 repas sans viande.

Les quatre premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 16 mesures de farine. Du 5° au 8° jour, elle reçoit 4 repas sans lait, puis on introduit 100 g. de lait par jour, jusqu'au 12° jour où l'enfant peut supporter 4 repas normaux. Elle pèse alors 8.300 g. (gain de 600 g.). La coproculture n'avait montré que des colibacilles non pathogènes.

- Réalimentation très progressive, la diarrhée ne cède que lentement, mais pas d'incident.

32° cas : Marie-France M. - 14 mois.

Poids à l'entrée : 11.500 g.

Régime habituel : 4 repas variés

Les deux premiers jours l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 16 mesures de farine, le 3° jour 4 repas sans lait, auxquels on ajoute chaque jour 100 g. de lait, jusqu'au 7° jour où l'enfant reçoit 4 repas normaux. Elle pèse alors 11.700 g. (gain de 200 g.). La coproculture avait décélé des levures.

- Réalimentation facile, sans incident.

33° cas : Denise W. - 7 mois.

Poids à l'entrée : 5.400 g.

Régime habituel : 6 biberons de 140 g. de lait Gloria + farine.

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 13 M.F. Le 4° jour, on introduit 200 g. de babeurre, puis 100 g. de plus par jour jusqu'au 7° jour, puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait de sorte qu'au 13° jour, l'enfant est à un régime normal : 500 g. de lait Gloria, 13 mesures de farine et 300 g. de carottes. Son poids est alors de 6.100 g. (gain de 700 g.). La coproculture n'avait montré que des colibacilles non pathogènes.

- Réalimentation progressive, sans incident.

34° cas : Eric F. - 9 mois.

Poids à l'entrée : 8.600 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 4 repas sans lait, puis on introduit chaque jour 100 g. de lait, de sorte qu'au 7° jour, l'enfant a un régime normal. Son poids est alors de 8.800 g. (gain de 200 g.).

- Réalimentation rapide, sans incident.

35° cas : André C. - 11 mois.

Poids à l'entrée : 8.150 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 16 M.F. le 4° jour, on introduit 200 g. de purée de légumes sans lait, le 5° jour, on passe à 4 repas sans lait, que l'on maintient 3 jours, puis on introduit 100 g. de lait par jour jusqu'au 13° jour où l'enfant peut recevoir 4 repas normaux. Son poids est alors de 8.100 g. La coproculture n'avait montré que des colibacilles non pathogènes.

- Réalimentation lente, la diarrhée cède difficilement et ne permet qu'au 8° jour l'introduction de lait dans le régime.

36° cas : Alain M. - 12 mois.

Poids à l'entrée : 8.000 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carottes et 16 M.F. Le 4° jour, on passe à 4 repas sans lait et le 6° jour, on commence à donner 100 g. de lait supplémentaires par jour, si bien qu'au 9° jour l'enfant reçoit 4 repas normaux. Son poids est alors de 8.500 g. (gain de 500 g.). La coprocul-ture avait montré des candidas.

- Réalimentation lente au départ, sans incident ensuite.

37° cas : Dakbia N. - 4 mois.

Poids à l'entrée : 5.250 g.

Régime habituel : Lait maternel.

Le premier jour, l'enfant reçoit 200 g. de babeurre, 580 g. de carottes et 8 M.F. le 2° jour 500 g. de babeurre, 280 g. de carottes et 8 M.F., le même régime le 3° jour. Le 4° jour, 300 g. de babeurre et 200 g. de lait S.M.A., puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait, jusqu'au 7° jour où l'enfant est au régime normal : 500 g. de lait S.M.A., 280 g. de carottes et 9 mesures de farine. Son poids est alors de 5.600 g. (gain de 350 g.).

- Réalimentation rapide et sans incident, bien qu'à la réalimentation se soit ajouté le sevrage de cette enfant élevée au sein.

38° cas : Maurice M. - 6 mois.

Poids à l'entrée : 7.250 g

Régime habituel : 4 repas variés.

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 12 mesures de farine; à partir du 3ème jour, on introduit chaque jour 100 g. de lait dans le régime et le 6ème jour l'enfant peut ainsi recevoir 4 repas normaux (350 g. de lait). Son poids est alors de 8.150 g., soit un gain de 900 g. La coproculture avait montré des *Proteus vulgaris* et des *Klebsilla aerobacter*.

- Réalimentation rapide et sans incident.

39° cas : André D.- 7mois

Poids à l'entrée : 8.000 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les 3 premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 15 M. F., le 4ème jour, 200 g. de babeurre, 16 M.F. et 600 g. de carotte, le 5° jour et le 6°, 200 g. de babeurre, 100 g. de lait et 500 g. de carotte, le 7° jour 200 g. de lait, 200 g. de babeurre et 400 g. de carotte, le 8° jour 200 g. de babeurre et 300 g. de lait ; le 9° jour : 4 repas normaux. Il pèse alors 8.700 g. (+ 700 g.) La coproculture avait montré des staphylocoques non pathogènes.

- Réalimentation facile : l'introduction de lait au 5ème jour entraîne une petite rechute de la diarrhée qui cède en maintenant le régime au même stade le jour suivant.

40° cas : Alain L. 6 mois

Poids à l'entrée : 5.300 g.

Régime habituel : 5 biberons de 145 g. Lait Alété

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 12 mesures de farine ; on introduit 200 g. de babeurre le 3° jour et 500 g. le 4° ; les jours suivants on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait. Au 9°, l'enfant a donc 500 g. de lait et 12 M F; on passe le 12ème jour à 5 repas dont 350 g. de lait et deux bouillies; en l'absence d'incident, on passe à 4 repas variés le 17° jour. L'enfant pèse alors 6.400 g. (+ 1.100 g.). La coproculture ne montrait que des colibacilles non pathogènes.

- Réalimentation rapide et sans incident, ce qui a permis de donner 4 repas variés, après 17 jours, à cet enfant qui était entré avec un régime purement lacté.

41° cas : Bruno H. 5 mois

Poids à l'entrée : 6.100 g.

Régime habituel : 5 biberons de 160 g. de lait de vache

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 10 M F. On introduit 200 g. de babeurre le 3^o jour, 400 g. les 4^o et 5^o jours, 500 g. le 6^o jour, puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait et au 12^o jour l'enfant a un régime normal : 500 g. de lait, 10 M F et 300 g. de carotte; il pèse le même poids qu'à l'entrée.

- La réalimentation n'a pas posé de problèmes particuliers et la diarrhée s'est rapidement amendée, mais l'enfant est décédé au 12^o jour, d'un syndrome hémorragique.

42^o cas : Stéphane B. 8 mois

Poids à l'entrée : 8.500 g.

Régime habituel : 4 biberons de 180 g. de lait de vache + farine.

Les 2 premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 16 mesures de farine; les 2 jours suivants on lui donne 4 repas sans lait et à partir du 5^o jour il supporte bien 4 repas normaux. Il pèse alors 8.850 g. (+ 350 g.)

- Réalimentation rapide et sans incident; l'enfant a passé sans trouble d'un régime lacto-farineux insuffisant à un régime varié.

43^o cas : Christine G. 2 mois et demi

Poids à l'entrée : 4.600 g.

Régime habituel : 6 biberons de 110 g. lait Pélargon

Les deux premiers jours l'enfant reçoit 720 g. de carotte et 5 MF, les jours suivants, on ajoute chaque jour 100 g. de babeurre puis, à partir du 6^o jour on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par du lait Guigoz. A partir du 11^e jour le régime, normal, comprend 500 g. de lait et 6 MF, les selles sont normales, mais l'enfant vomit à chaque biberon, ce qui décide à changer son lait pour le lait Prodiéton. 5 jours après, une rechute de diarrhée interrompt le régime et l'enfant reçoit le 23^o jour 720 g. de carotte et 7 MF; le 24^o jour, on redonne 200 g. de babeurre et 400 g. le 25^o jour; le 26^o jour, 400 g. de babeurre et 100 g. de lait Prodiéton; les jours suivants, on remplace chaque jour 100 g. de babeurre

par 100 g. de lait jusqu'au 29^o jour où l'enfant retrouve un régime normal avec 500 g. de lait et 7 M.F. Elle pèse alors 5.500 g. (gain de 900 g.). La coproculture montrait des colibacilles pathogènes des groupes 111 B 4 et 55 B 5.

- Réalimentation difficile; des vomissements persistant obligent à changer le lait, puis une rechute de la diarrhée fait reprendre la réalimentation depuis le début. On peut cependant parvenir à un régime normal.

44^o cas : Jean-Jacques H. 11 mois

Poids à l'entrée : 10.000 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les 5 premiers jours l'enfant reçoit 4 repas sans lait; les 6^o et 7^o jours, 100 g. de lait, 200 g. le 8^o jour et 300 g. le 9^o et le 10^o jour, puis il passe à 4 repas normaux. Il pèse alors 10.200 g. (gain de 200 g.). La coproculture avait montré des aerobacter aérogénés.

- Réalimentation lente au départ, puis normale et sans incident.

45^o cas : Guylaine T. 13 mois

Poids à l'entrée : 8.450 g.

Régime habituel : 4 repas de 200 g. de lait de vache + F.

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 14 M F; le 4^o jour, 100 g. de lait et 300 le 5^o jour, à partir du 6^o jour, elle reçoit 4 repas variés qu'elle supporte bien.

- Réalimentation rapide et sans incident, ce qui permet de passer à 4 repas variés cette enfant de 13 mois qui avait encore un régime lacto-farineux.

46° cas : Didier S. 14 mois

Poids à l'entrée : 7.400 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les 5 premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 16 M F; les 6° et 7° jours, il reçoit 4 repas sans lait; les selles sont normales et le 8° jour on donne 4 repas normaux. Mais au 15° jour, on assiste à une reprise du syndrome gastro-entéritique, ce qui fait supprimer le lait pendant 5 jours, puis on ajoute 100 g. de lait par jour et au 21° jour on peut redonner 4 repas normaux. L'enfant pèse alors 7.700 g. (gain de 300 g.). La coproculture montrait des colibacilles pathogènes des groupes 125^{B5} et 128^{B12}.

- La diarrhée profuse des premiers jours ne permet tout d'abord que la carotte; la réalimentation se fait facilement ensuite, mais il se produit une rechute au 15° jour, rapidement guérie.

47° cas : Madera M. 3 mois

Poids à l'entrée : 6.800 g.

Régime habituel : lait Guigoz (quantité inconnue)

Le premier jour, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 6 M F, le 2° jour, on donne 300 g. + 100 g. de lait babeurre, le 3° jour 200 g. de babeurre et 200 g. de lait, les 4° et 5° jours 100 g. de babeurre et 400 g. de lait, et le 6° jour régime normal : 500 g. de lait et 6 MF. Le poids est alors de 6.950 g. (gain de 150 g.)

- Réalimentation rapide et sans incident.

48° cas : Catherine R. 3 mois

Poids à l'entrée : 5.200 g.

Régime habituel : 5 biberons de 140 g. de lait de vache + 4 M F

Le premier jour, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 6 M F, le 2° jour, 200 g. de babeurre et 400 g. le 3° jour; le 4° jour, on donne 300 g. de babeurre et 200 g. de lait. Une rechute minime fait conserver ce régime deux jours puis on continue à remplacer chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait et le 9° jour on arrive au régime normal qui peut être continué sans rechute. L'enfant pèse alors 5.800 g. (gain de 600 g.).

- Réalimentation facile, une petite rechute au 5° jour cède sans qu'il soit besoin de revenir en arrière.

49° cas : Véronique B. 6 mois

Poids à l'entrée : 5.700 g.

Régime habituel : 4 biberons de 160 g. de lait de vache

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 14 M F; Le 3° jour on introduit 200 g. de babeurre, et 500 g. le 4° jour, puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait Guigoz, de sorte qu'au 9° jour, l'enfant est au régime normal : 500 g. de lait, 14 M F et 300 g. de carotte. Elle pèse alors 6.850 g. soit un gain de 1.150 g.

- Réalimentation rapide, sans incident.

50° cas : Estelle M. 5 mois

Poids à l'entrée : 6.400 g.

Régime habituel : 5 biberons de 160 g. Lait Alété bleu

Les 2 premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 10 M F; le 3° jour, on donne 300 g. de babeurre et 500 g. le 4° jour, puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait, de sorte qu'au 9° jour l'enfant a un régime normal : 500 g. de lait Alété et 10 M F. Son poids est de 7.000 g., soit un gain de 600 g. La coproculture avait montré des colibacilles pathogènes des groupes 119^{B4}, 86^{B7}, 26^{B6}, 55^{B5}.

- Réalimentation rapide et sans incident.

51° cas : Marco T. 5 mois

Poids à l'entrée : 7.400 g.

Régime habituel : 6 biberons de 170 g. lait de vache

Le premier jour, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 9 M F ; le 2° jour on introduit 200 g de babeurre, puis 100 g de plus par jour à partir du 5° jour, on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait et au 10° jour, l'enfant a un régime normal : 500 g de lait, 9 mesures de farine et 300 g de carotte. Il pèse 7.800 (gain de 400 g). La coproculture montrait des colibacilles des groupes 128 B¹², 119^{B14}, 127^{B8}, 55^{B5}, 26^{B6} et des levures.

- Réalimentation rapide et sans incident.

52° cas : Nadia S ; 15 mois

Poids à l'entrée : 9.200 g

Régime habituel 4 repas variés

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 16 M F .
le 3° jour, elle est à 4 repas sans lait, et le 4° jour à 4 repas normaux. Elle pèse alors 9.600 g (gain de 400 g).

- Réalimentation rapide et sans incident.

53° cas : Jean-Pierre L. 3 mois

Poids à l'entrée : 3.800 g

Régime habituel : 5 biberons de 140 g Léomiel

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 720 g de carotte et 6 MF; le 4° jour, il reçoit 300 g de babeurre, et 500 g les 5° et 6° jours; le 7° jour, on remplace 100 g de babeurre par 100 g de lait; l'augmentation du nombre des selles fait maintenir ce régime le jour suivant. Le 9° jour, 200 g de lait, les selles augmentent et les 10° et 11° jours on ne change rien. Le 12° jour on passe à 300 g. de lait,

maintenus le 13^o jour. Le 14^o jour on donne 400 g de lait (+ 100 g de babeurre et 7 M F). On maintient ce régime jusqu'au 24^o jour, les selles sont au nombre de 3 à 6 par jour, mais l'état de l'enfant empire et il décède au 24^o jour dans un syndrome hémorragique. Son poids était alors de 4.800 g (+ 1.000 g). La coproculture montrait des colibacilles pathogènes des groupes 119^{B24} et 127^{B8}.

- Réalimentation très lente et ne permettant pas de parvenir à un régime normal. L'enfant décède dans un syndrome hémorragique.

54^o cas : Fabrice Q. 7 mois

Poids à l'entrée : 7.600 g

Régime habituel : 4 repas sans viande 500 g de lait de vache

Les 4 premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 14 M F; le 5^o jour on lui donne 200 g de babeurre et 500 g le 6^o jour, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait SMA; au 11^o jour, il reçoit donc 500 g de lait et le 13^o jour, on peut passer à 4 repas normaux. Il pèse alors 7.950 g (gain de 350 g) La coproculture montrait des colibacilles pathogènes des groupes 55^{B5} et 119^{B14}.

Réalimentation rapide, sans incident.

55^o cas : Frédéric D. 6 mois

Poids à l'entrée : 7.900 g

Régime habituel : 4 repas variés

Les 3 premiers jours l'enfant reçoit 800 g de carotte et 16 M F; le 4^o jour 200 g. de babeurre et 500 g le 5^o jour. La diarrhée persistant, on donne le 6^o jour une purée de riz; les 3 jours suivants, l'enfant supporte 100 g de lait et le 10^o jour, il reçoit 4 repas variés, mais il décède d'un collapsus cardio-vasculaire brutal. La coproculture montrait des colibacille pathogènes du groupe 127^{B8}.

- Réalimentation difficile : le babeurre n'apporte pas l'amélioration qui est obtenue avec la purée de riz; on arrive à redonner un régime normal, mais l'enfant, entré pour une coqueluche, décède d'un collapsus cardio-vasculaire brutal.

56° cas : Myriam F. 17 mois

Poids à l'entrée : 8.200 g

Régime habituel : 4 repas variés

Les 3 premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 15 M F; le 4° jour, on lui donne 4 repas avec 200 g de lait, que l'on maintient 3 jours, puis on passe à 4 repas normaux le 8° jour. Son poids est alors de 8.800 g (+ 600 g). La coproculture montrait des proteus et des levures.

- Réalimentation rapide et sans incident.

57° cas : Gilles L. 1 mois

Poids à l'entrée : 4.000 g

Régime habituel : sein + 4 biberons 90 g lait Alma

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 660 g de carotte et 2 MF; le 3° jour, on donne 100 g de babeurre; le 4° jour, 300 g de babeurre et 100 g de lait Alma, du 5° au 8° jour, 200 g de babeurre et 300 g de lait, le 8° jour, 100 g de babeurre et 400 g de lait, le 9° jour, régime normal : 500 g de lait et 3 M F. Il pèse alors 4.400 g et va bien.

Mais 18 jours plus tard à l'occasion d'une poussée otitique, une rechute diarrhéique apparait, sans perte de poids (4.800 g). Les 2 premiers jours on donne 500 g de babeurre; la diarrhée persiste, et le 3° jour on donne 300 g de babeurre et 420 g de carotte + 5 M F; les 4°, 5° et 6° jours, 500 g de babeurre et 220 g de carotte, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait jusqu'au 9° jour où la diarrhée reprend; régime stationnaire pendant 3 jours, la diarrhée s'accroît et l'on revient au 14° jour à 500 g de babeurre que l'on maintient 2 jours. Au 17° jour, on recommence à remplacer chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait; tout se passe bien et on arrive au régime normal au 22° jour, sans nouvel incident : 500 g de lait Guigoz, 220 g de carotte et 5 M F. Le poids est alors de 5.100 g (+ 300 g). La coproculture montrait des levures et des colibacilles non pathogènes.

- La diarrhée qui existait à l'entrée cède bien au traitement et permet une réalimentation progressive, marquée seulement par une rechute discrète au 5° jour. Mais trois semaines après la guérison apparaissent une otite et une nouvelle diarrhée qui répond beaucoup moins bien au traitement et dont la réalimentation sera beaucoup plus lente et entrecoupée de rechutes sérieuses qui obligent à reprendre le régime.

58° cas : Luc M. 4 mois

Poids à l'entrée : 6.800 g

Régime habituel : 5 biberons de 175 g Alma $\frac{1}{2}$ écrémé + 4 M F

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 8 M F. Le 4° jour, on donne 200 g de babeurre et 500 g le 5° jour, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait; arrêt de la progression les 8° et 9° jours, puis reprise, et on arrive au régime normal le 13° jour (500 g de lait). Le lendemain, rechute grave, l'enfant est remis à la carotte (800 g) pendant 3 jours. Au 18° jour, 200 g de babeurre, 600 g de carotte et 10 M F; le 19° jour, 400 g de babeurre et 100 g de lait Alma : rechute de la diarrhée, arrêt de la progression pendant 2 jours. 22° jour : 300 g de babeurre et 200 g de lait; 23° jour : 200 g de babeurre et 300 g de lait, maintenu 3 jours, 27° jour : 400 g de lait, et le 28° jour on arrive au régime normal. Le poids est de 7.700 g (gain de 900 g). La coproculture ne montrait que des colibacilles non pathogènes.

- Réalimentation très lente et très difficile, entrecoupée de rechutes qui obligent à arrêter la progression à plusieurs reprises et même à revenir en arrière. Le régime normal est enfin obtenu après un mois de traitement.

59° cas : Jean-Pierre B. 13 mois

Poids à l'entrée : 8.400 g

Régime habituel : 4 repas variés.

Les 3 premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 14 M F. Les 4° et 5° jours 600 g de carotte et 200 g de purée de légumes; le 6° jour 4 repas sans lait, puis 100 g de lait supplémentaire par jour et le 10° jour, l'enfant reprend son régime normal : 4 repas normaux. Son poids est de 9.250 g. ; soit un gain de

850 g. La coproculture montrait des colibacilles pathogènes des groupes 111^{B4}, 26^{B6}, 55^{B5}, 128^{B12} et 125^{B15}.

- Réalimentation facile, sans incident.

60° cas : Ghislaine P. 1 mois $\frac{1}{2}$.

Poids à l'entrée : 3.300 g

Régime habituel : 6 biberons 110 g de lait Nestlé

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 660 g de carotte et 3 M F, le 3° jour 200 g de babeurre et 460 g de carotte, le 4° jour 500 g de babeurre et 160 g de carotte le 4° jour 500 g de babeurre et 160 g de carotte, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait jusqu'au 9° jour où l'enfant est à un régime normal. La diarrhée a disparu mais l'état général ne s'amende pas et l'enfant décède 10 jours après son entrée dans un tableau hémorragique.

- Pas de problème de réalimentation, mais l'enfant qui était prématurée (7 mois) présente un syndrome hémorragique dont elle meurt.

61° cas : Francis D. 2 mois

Poids à l'entrée : 3.200 g

Régime habituel : 6 biberons de 100 g lait Nido $\frac{1}{2}$ écrémé

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 660 g de carotte et 3 MF, le 3° jour 200 g de babeurre et 300 g le 4° et 5° jour, le 6° jour 500 g, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait, avec des arrêts à 300 g et 400 g de lait; au 14° jour, l'enfant a un régime normal : 500 g de lait Nido et 3 M F, la quantité de liquide étant complétée par la carotte. Il pèse alors 3.700 g, soit un gain de 500 g.

- Réalimentation lente chez ce prématuré de 2.000 g, sans incident.

62° cas : Jean-Jacques T. 3 mois

Poids à l'entrée : 4.000 g

Régime habituel : 6 biberons de 130 g lait de vache + 6 M F

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 720 g de carotte et 4 M F; le 3° jour, on ajoute 200 g de babeurre et 500 g le 4° jour, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait, et au 10° jour l'enfant a un régime normal comprenant 500 g de lait. Il pèse alors 4.800 g (gain de 800 g). La coproculture montrait des colibacilles pathogènes du groupe 26^{B6}.

- Réalimentation facile et sans incident.

63° cas : Jean-Michel M. 10 mois

Poids à l'entrée : 7.900 g

Régime habituel : 4 repas variés

Les 3 premiers jours l'enfant reçoit 800 g de carotte et 16 M F; le 4° jour on donne 200 g de purée de légume, le 5° jour 500 g de carotte, 200 g de purée et 100 g de lait Guigoz, le 6° jour 200 g de lait déclenchent une rechute qui s'amende en conservant le même régime pendant 4 jours. Le 10° jour, il a 300 g de lait et 400 g le 11° jour; il supporte au 12° jour 4 repas normaux. Il pèse alors 8.800 g (+ 900 g) La coproculture montrait des colibacilles pathogènes des groupes 127^{B8} et 119^{B14}.

- Réalimentation rapide, malgré une petite rechute au 6° jour, qui a fait arrêter la progression pendant quelques jours.

64° cas : Jean-Pierre L. 9 mois

Poids à l'entrée : 7.150 g

Régime habituel : 4 repas normaux

Les 4 premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 14 M F; les 3 jours suivants, il reçoit 4 repas sans lait, puis on ajoute chaque jour 100 g de lait, de

sorte qu'au 12^o jour, il peut supporter 4 repas normaux. Il pèse alors 7.400 g (gain de 250 g). La coproculture montrait des para-coli et des colibacilles pathogènes du groupe 26^{B6}.

- Réalimentation lente, sans incident.

65^o cas : Pascal E. 7 mois

Poids à l'entrée : 8.000 g

Régime habituel : 4 repas variés.

Les 4 premiers jours, l'enfant reçoit 4 repas sans lait; puis on introduit chaque jour 100 g de lait dans le régime et au 8^o jour, il reçoit 4 repas normaux. Il a repris son poids de 8.000 g.

Réalimentation rapide, sans incident.

66^o cas : Andréa D. 18 mois

Poids à l'entrée : 7.000 g

Régime habituel : 4 repas

Les 3 premiers jours, l'enfant reçoit 4 repas sans lait, puis on ajoute chaque jour 100 g de lait, de sorte qu'au 7^o jour, elle a un régime normal; elle pèse 7.800 g (gain de 800 g).

- Réalimentation rapide , sans incident.

67^o cas : Marilyn P. 5 mois

Poids à l'entrée : 5.450 g

Régime habituel : 6 biberons de 160 g de lait de vache

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 9 mesures de farine. On ajoute 200 g de babeurre le 4^o jour, 400 g le 5^o et 500 g le 6^o. Puis,

on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait et au 10^e jour, l'enfant a 500 g de lait et 10 mesures de farine; on passe à 5 repas le 13^e jour. Elle pèse alors 6.250 g (gain de 800 g).

Réalimentation rapide et sans incident.

68^e cas : Xavier R. 5 mois

Poids à l'entrée : 8.100 g

Régime habituel : 5 biberons de 130 g lait ALMA et farine.

Le premier jour, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 10 M F, le 2^e jour 200 g de babeurre, 500 g le 3^e jour, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait et au 7^e jour l'enfant a un régime normal comprenant 500 g de lait. Mais 15 jours plus tard, il fait une rechute. Le premier jour, il reçoit 4 repas sans lait, puis on ajoute chaque jour 100 g de lait et le 5^e jour, il a un régime normal avec 4 repas variés. Il a repris le poids qu'il avait à l'entrée. La copro-culture montrait des colibacilles pathogènes du groupe 26^{B6}.

- Réalimentation rapide et sans incident. Une rechute quinze jours plus tard oblige à reprendre la réalimentation. L'enfant est rééquilibré avec 4 repas variés.

69^e cas : Patrick P. 3 mois

Poids à l'entrée : 4.800 g

Régime habituel : 6 biberons de 135 g de lait de vache

Le premier jour l'enfant reçoit 720 g de carotte et 5 M F. Le 2^e jour 200 g de lait, puis 100 g de plus par jour, et le 6^e jour il a un régime normal : 500 g de lait et 6 M F. Il pèse 5.000 g (+ 200 g).

- La réalimentation a été particulièrement rapide, directement au lait.

70° cas : Adeline B. 16 mois

Poids à l'entrée : 10.600 g

Régime habituel : 4 repas variés

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 4 repas sans lait, puis on introduit chaque jour 100 g de lait et au 7° jour, l'enfant est à un régime normal de 4 repas variés. Elle pèse 11.200 g et a grossi de 600 g.

- Réalimentation rapide, sans incident.

71° cas : Patrick J. 13 mois

Poids à l'entrée : 10.200 g

Régime habituel : 4 repas variés

Les 4 premiers jours, l'enfant reçoit 4 repas sans lait, puis on ajoute chaque jour 100 g de lait, et au 9° jour, l'enfant a 4 repas normaux. Il pèse 10.700g (gain de 500 g)

- Réalimentation lente, sans incident.

72° cas : Ludovic C. 6 semaines

Poids à l'entrée : 4.000 g

Régime habituel : 6 biberons de 120 g de lait Gloria

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 720 g de carotte et 3 M F; le 3° jour 100 g de babeurre, 300 g le 4° jour, le 5° jour : 300 g de babeurre et 100 g de lait Gloria, les 6° et 7° jours 300 g de babeurre et 200 g de lait, puis on remplace un jour sur deux 100 g de babeurre par 100 g de lait et le 12° jour l'enfant a un régime normal avec 500 g de lait. Il pèse 4.850 g (gain de 850 g).

- Réalimentation facile et sans incident.

73° cas : Patricia M. 2 mois $\frac{1}{2}$.

Poids à l'entrée : 5050 g

Régime habituel : 6 biberons de 120 g lait Gallia sec + 5 M F

Le premier jour, l'enfant reçoit 720 g de carotte et 5 M F; le 2° jour 200 g de babeurre et 400 g le 3° jour; des oedèmes étant apparus, on donne le 4° jour 250 g de Pennac et 250 g de babeurre, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait Pennac, jusqu'au 7° jour où elle reçoit 500 g de Pennac; on conserve ce lait jusqu'au 11° jour où on le remplace par le lait Gallia sec. L'enfant pèse alors 5.300 g, il a grossi de 250 g. La coproculture montrait des colibacilles pathogènes du groupe 111^{B4}.

- Réalimentation rapide, l'apparition d'oedèmes a fait donner d'abord du lait Pennac qui a été remplacé par le Gallia sans ennui.

74° cas : Patricia D. 12 mois

Poids à l'entrée : 8.000 g

Régime habituel : 5 biberons de 200 g lait Nestlé + 2 M F

Les 2 premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carottes et 14 M F, les deux jours suivant, 200 g de babeurre, puis 400 g le jour suivant; le 6° jour 400 g de babeurre et 100 g de lait, le 7° jour, 4 repas avec 200 g de lait, le 8° jour, 4 repas avec 300 g. de lait et à partir du 9° jour, 4 repas normaux. La coproculture montrait des colibacilles pathogènes du groupe 111 B 4.

- Réalimentation facile; on a pu passer d'un régime lacto-farineux à 4 repas variés.

75° cas : Nathalie L. 9 mois

Poids à l'entrée : 7.500 g

Régime habituel : 4 repas variés.

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 14 M F; les 3° et 4° jours, 4 repas sans lait; il pèse 7.900 g (gain de 400 g), la diarrhée a disparu et l'enfant est reprise par sa famille avant d'avoir repris un régime normal.

76° cas : Philippe L. 9 jours

Poids à l'entrée : 2.450 g

Régime habituel : 6 biberons de 60 g de lait Gallia sec

Le premier jour, l'enfant reçoit 250 g de carotte et 250 g de babeurre, les 2° et 3° jours on remplace 100 g de babeurre par 100 g de lait Gallia et on arrive au 5° jour avec 250 g de carotte et 300 g de lait. Le 8° jour on ajoute une M F, le 9° jour, l'apparition de selles liquides fait remplacer 200 g de lait par 200 g de babeurre. La diarrhée persiste et l'on donne, le 12° jour, 200 g de carotte et 350 g de babeurre; le 13° jour, 250 g de babeurre et 100 g de lait, régime maintenu 4 jours, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait et le 20° jour, l'enfant est à un régime normal auquel il se maintient. Il pèse 3.150 g (gain de 700 g).

- Réalimentation lente et difficile, avec des rechutes qui obligent à s'arrêter et même revenir en arrière; on parvient cependant à un régime satisfaisant.

77° cas : Martine D. 10 mois

Poids à l'entrée : 8.000 g

Régime habituel : 4 repas variés.

Les 6 premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 16 M F; à partir du 7° jour, elle reçoit 4 repas avec 100 g de lait de plus par jour et le 11° jour elle est à 4 repas normaux. Elle pèse 8.800 g (gain de 800 g). La coproculture montrait des colibacilles du groupe 125^{B15}.

- Réalimentation lente au départ, la diarrhée ayant persisté plusieurs jours.

78° cas : Monique M. 10 mois

Poids à l'entrée : 8.450 g

Régime habituel : 4 repas variés

Les 5 premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 16 M F. Les 6° et 7° jours, elle reçoit 4 repas sans lait, puis on ajoute chaque jour 100 g de lait; le 11° jour, elle a 4 repas normaux. Elle pèse 8.700 g (gain de 250 g). La copro-culture montrait des colibacilles pathogènes du groupe 127^{B8}.

- Réalimentation très lente, la diarrhée ne cédant que difficilement.

79° cas : Martine D. 5 semaines

Poids à l'entrée : 3.100 g

Régime habituel : 6 biberons de 95 g lait Alma $\frac{1}{2}$ écrémé.

Le premier jour, l'enfant reçoit 600 g de carotte et 1 M F, puis on ajoute chaque jour 100 g de babeurre; le 6° jour, elle a 500 g de babeurre et on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait. Le 9° jour la diarrhée recommence et on donne à l'enfant 460 g de carotte et 200 g de lait, puis on remplace chaque jour 100 g de carotte par 100 g de lait; Au 13° jour, elle a un régime normal et pèse 3.700 g.

Deux semaines plus tard, alors que l'enfant a deux mois et pèse 4.100 g, nouvelle rechute. On donne pendant 2 jours 720 g de carotte et 4 M F. On ajoute 150 g de babeurre le jour suivant, puis 300 g, 400 g pendant 2 jours; le 7° jour, on peut introduire 100 g de lait, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait. Enfin, au 12° jour, le régime est normal : 500 g de lait et 5 M F. L'enfant pèse 4.300 g (+ 200 g).

- L'enfant qui était prématurée a été difficile à réalimenter et a présenté plusieurs rechutes graves. On est cependant arrivé à un régime normal.

80° cas : Alain D. 7 mois

Poids à l'entrée : 9.000 g

Régime habituel : 4 repas variés.

Les 3 premiers jours, l'enfant a reçu 800 g de carotte et 14 M F; le 4° jour on lui donne 4 repas avec 100 g de lait, et chaque jour, on ajoute 100 g de lait en plus, de sorte qu'au 7° jour, il a 4 repas normaux. Il pèse 9.500 g et a grossi de 500 g.

- Réalimentation rapide, sans incident.

81° cas : Nacera S. 3 mois

Poids à l'entrée : 4.600 g

Régime habituel : 6 biberons de 100 g de lait de vache + 1 M F

Le premier jour, l'enfant reçoit 720 g de carotte et 5 M F; puis on ajoute chaque jour 100 g de babeurre jusqu'à 500 g; on remplace alors chaque jour 100g de babeurre par 100 g de lait, de sorte qu'au 11° jour l'enfant a un régime normal : 500 g de lait et 6 M F . Elle pèse 5.200 g (gain de 600 g). La coproculture montrait des colibacilles pathogènes des groupes 127^{B138} et 86^{B7}.

- Réalimentation rapide, sans incident.

82° cas : Yannick B. 3 semaines

Poids à l'entrée : 3.000 g (P.N.)

Régime habituel : 6 biberons de 80 g lait Gallia vert

Le premier jour, l'enfant reçoit 540 g de carotte et 1 M F; les jours suivants on donne 100, 200 puis 300 g de babeurre, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait et le 8° jour, l'enfant a un régime normal avec 350 g de lait. Il pèse 3.300 g (gain de 300 g).

- Réalimentation facile malgré le jeune âge de l'enfant.

83° cas : Céline B. 4 mois

Poids à l'entrée : 4.800 g

Régime habituel : 6 biberons de 140 g Alma $\frac{1}{2}$ écrémé et 6 M F

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 8 M F puis on ajoute chaque jour 100 g de babeurre, jusqu'à 500 g, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait. Au 13° jour elle a 150 g de carotte, 200 g de babeurre, 300 g de lait et 200 g de légumes, on garde ce régime 4 jours, puis on passe à 4 repas normaux, l'enfant pèse alors 5.500 g. Onze jours après, rechute de la diarrhée. On reprend le même schéma : pendant deux jours, 800 g de carotte et 14 M F, puis 100 g de babeurre par jour jusqu'à 500 g; à ce moment on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait; on reste à 500 g de lait pendant 3 jours, puis on passe à 5 repas le 15° jour. L'enfant pèse alors 5.800 g (gain de 300 g)

- Réalimentation lente la première fois; une rechute 10 jours après oblige à revenir en arrière; la réalimentation lente ne permet après 15 jours que de donner 5 repas alors que l'enfant était à 4 repas variés.

84° cas : Marianne B. 7 mois

Poids à l'entrée : 6.000 g

Régime habituel : 5 biberons de 180 g lait Nestlé + 5 M F

Le premier jour, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 13 M F, puis on ajoute chaque jour 100 g de babeurre jusqu'à 500 g; alors, on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait. Ainsi l'enfant reçoit 500 g de lait et 13 M F le 10° jour, on maintient ce régime 3 jours puis on passe à 5 repas. L'enfant pèse alors 6.400 g (gain de 400 g).

- Réalimentation rapide, sans incident.

85° cas : Véronique P. 3 mois

Poids à l'entrée.: 4.000 g

Régime habituel : 6 biberons de 120 g lait Nestlé

Le premier jour, l'enfant reçoit 720 g de carotte et 6 M F, les jours suivant, on ajoute 100, 200 puis 300 g de babeurre; le 5° jour 300 g de babeurre et 100 g de lait, le 6° jour 200 g de babeurre et 200 g de lait, le 7° jour, 200 g de babeurre, 300 g de lait et 7 M F, le 8° jour, 100 g de babeurre et 400 g de lait une rechute de la diarrhée oblige alors à reprendre le régime de carotte : 720 g le 9° jour, puis on recommence à introduire chaque jour 100 g de babeurre jusqu'à 500 g, puis à remplacer chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait Guigoz et au 19° jour l'enfant a un régime normal comprenant 500 g de lait et 7 M F. Elle pèse 4.600 g, soit un gain de 600 g.

- Réalimentation lente, une rechute au 9° jour a obligé à reprendre le régime depuis le début.

86° cas : Bruno 10 mois

Poids à l'entrée : 8.800 g

Régime habituel : 4 repas de 240 g de lait + 16 M F

Les deux premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 16 M F; le 4° jour 4 repas avec 100 g de lait, 200 g de lait le 5° jour et 4 repas normaux le 6° jour. Il pèse alors 9.300 g (gain de 500 g). La coproculture avait montré des entéro-levures.

- Réalimentation rapide et sans incident.

87° cas : Bruno M. 17 mois

Poids à l'entrée : 10.800 g

Régime habituel : 4 repas variés .

Les 3 premiers jours, l'enfant reçoit 4 repas sans lait, puis on ajoute 100 g de lait par jour et le 7^o jour, il a un régime normal. La coproculture montrait du bacillus mesentericus.

- Réalimentation rapide, sans incident.

88^o cas : Brahim M. 13 mois

Poids à l'entrée : 9.300 g

Régime habituel : 4 repas variés.

Les quatre premiers jours, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 16 M F, les deux jours suivant, on donne 200 g de purée de légume, puis 4 repas avec 100 g de lait. On augmente le lait de 100 g par jour, et le 11^o jour l'enfant a 4 repas normaux. Il pèse 9.800 g (gain de 500 g). La coproculture montrait des entérocoques et des colibacilles non pathogènes.

- Réalimentation simple, sans incident.

89^o cas : Eric H. 1 semaine

Poids à l'entrée : 2.600 g

Régime habituel : Guigoz (quantité inconnue)

Le premier jour, l'enfant reçoit 320 g de carotte, 100 g de babeurre et une demie mesure de farine, le 2^o jour 200 g de babeurre, le 3^o jour, 200 g de babeurre et 100 g de lait SMA, le 4^o jour, 100 g de babeurre et 200 g de lait, le 5^o jour, 300 g de lait et une M F.

Douze jours plus tard, rechute. Il pèse alors 3.500 g et a 25 jours. On lui donne pendant 3 jours 300 g de babeurre et 300 g de carotte, le 4^o jour, 400 g de carotte et 200 g de babeurre, le 5^o jour, 360 g de carotte et 300 g de babeurre, le 6^o jour, 260 g de carotte, 400 g de babeurre et 2 M F, le 7^o jour, 160 g de carotte 400 g de babeurre et 100 g de lait; le 8^o jour, on passe à 200 g de lait; on maintient ce régime pendant 5 jours à cause d'une diarrhée persistante; le 14^o jour,

on peut passer à 400 g de lait et le 15° jour à 500 g qui constitue son régime normal. L'enfant pèse alors 4.200 g (gain de 700 g). La coproculture montrait des colibacilles du groupe 119^{B16}.

- Réalimentation simple la première fois, mais une rechute grave apparaît qui sera beaucoup plus difficile à juguler, la réalimentation étant freinée à plusieurs reprises par des rechutes.

90° cas : Josiane P. 6 mois

Poids à l'entrée : 6.900 g

Régime habituel : 4 repas variés.

Le premier jour, l'enfant reçoit 800 g de carotte et 14 M F, le 2° jour, on introduit 200 g de babeurre, et 500 g le 3° jour, puis on remplace chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait; au 8° jour l'enfant a ainsi 500 g de lait, on attend 2 jours, et on passe à 5 repas. Il pèse alors 7300 g (gain de 400 g). La coproculture ne montre que des colibacilles non pathogènes.

- Réalimentation simple et sans incident.

91° cas : Josette P. 6 semaines

Poids à l'entrée : 3.700 g

Régime habituel : 6 biberons de 120 g lait Gallia vert.

Le premier jour, l'enfant reçoit 720 g de carotte et 2 M F, puis on ajoute chaque jour 100 g de babeurre jusqu'à 500 g; on remplace alors chaque jour 100 g de babeurre par 100 g de lait et le 10° jour, l'enfant atteint son régime normal : 500 g de lait et 3 M F. Elle pèse alors 4.000 g (gain de 300 g).

- Réalimentation simple, sans incident.

92° cas : Muriel B. 1 mois

Poids à l'entrée : 3.500 g.

Régime habituel : 6 biberons de 80 g. lait Nestlé

Le premier jour, l'enfant reçoit 660 g. de carottes et 2 M.F. ; le 2° jour, on ajoute 200 g. de babeurre et 400 et 500 g. les jours suivants ; puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait et l'enfant arrive ainsi au régime normal le 9° jour avec 500 g. de lait S.M.A. et 3 M.F. Elle pèse alors 4.000 g. (gain de 500 g.). La coproculture ne montrait pas de colibacille pathogène.

- Réalimentation simple, sans incident.

93° cas : Bruno B. 6 mois

Poids à l'entrée : 8.500 g.

Régime habituel : inconnu

Les cinq premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 12 m.F. le 6° jour, on donne 400 g. de babeurre et 500 g. le 7° jour, puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait jusqu'au 12° jour où il a 500 g. de lait. On attend 2 jours et on passe à 5 repas. Il pèse alors 8.700 g. La coproculture ne montre pas de germe pathogène.

- Réalimentation simple, sans incident.

94° cas : Viviane D. 2 mois.

Poids à l'entrée : 4.800 g.

Régime habituel : 6 biberons de 100 g. lait Mont - Blanc

Le premier jour, l'enfant reçoit 720 g. de carotte et 4 M.F. Puis on introduit chaque jour 100 g. de babeurre jusqu'à 500 g. On remplace alors chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait Prodiéton et au 9° jour, l'enfant a un régime normal : 500 g. de Prodiéton et 5 M.F.

Six jour après, une rechute oblige à reprendre les biberons de carotte (720 g. + 6 M.F.) pendant 3 jours, auxquels on substitue chaque jour 100 g. de babeurre ; le 6° jour, nouvelle rechute, on reprend à 720 g. de carotte pendant

2 jours ; on ajoute ensuite 100 g. de babeurre par jour jusqu'à 500 g., on remplace alors chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait et le régime normal est enfin atteint au 18^e jour avec 500 g. de lait. L'enfant ne pèse encore que 5.100 g. (gain de 300 g. en 33 jours).

- La réalimentation, très prudente est cependant mal tolérée et il faudra à trois reprises revenir en arrière. On parvient cependant à un régime normal.

95^e cas : Pierre-Yves J. 8 mois.

Poids à l'entrée : 7.600 g.

Régime habituel : 4 repas variés

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 14 M.F. le 4^e jour, on donne 4 repas sans lait, puis on ajoute chaque jour 100 g. de lait et le 8^e jour, l'enfant a 4 repas normaux. Il pèse 7.800 g. (gain de 200 g.)

- Réalimentation rapide, sans incident.

96^e cas : Josiane J. 6 mois

Poids à l'entrée : 5.800 g.

Régime habituel : 5 biberons de 200 g. lait Nestlé + 2 M.F.

Le premier jour, l'enfant reçoit 800 g. de carotte et 8 M.F. ; on donne 400 g. de babeurre le 2^e jour et 500 g. le 3^e ; puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait. Le 7^e jour, elle a un régime normal avec 500 g. de lait, mais le lendemain, une otite déclenche une nouvelle diarrhée qui fait donner 800 g. de carotte et 10 M.F. Puis on remplace chaque jour 100 g. de carotte par 100 g. de lait, pour aboutir au 14^e jour à 500 g. de lait. On passe à 5 repas le 16^e jour. L'enfant pèse alors 6.200 g. (gain de 400 g.). La coproculture ne montrait pas de germe pathogène.

- Réalimentation rapide, mais une rechute apparaît au 8^e jour, la seconde réalimentation se passe sans incident.

97^e cas : Jean B. 16 mois

Poids à l'entrée : 10.200 g.

Régime habituel : 4 repas variés.

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 4 repas sans lait, le 4^o jour l'introduction de 100 g. de lait déclenche une rechute. Les 5^o et 6^o jours, 4 repas sans lait. Il pèse 10.400 g. (gain de 200 g.), la coproculture ne montre pas de germe pathogène.

- L'introduction de lait déclenche une rechute, et l'enfant est repris par sa famille avant que la réalimentation soit faite.

98^o cas : Charles B. 2 mois

Poids à l'entrée : 5.500 g.

Régime habituel : 6 biberons de 130 g. de lait Nestlé.

Le premier jour, l'enfant reçoit 720 g. de carotte et 4 M.F. On donne 200 g. de babeurre le 2^o jour et 500 le 3^o ; puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait et l'enfant a un régime normal le 9^o jour : 500 g de lait Alma et 5 M.F. Il pèse 6.200 g. (gain de 700 g.). La coproculture ne montre pas de germe pathogène.

- Réalimentation rapide, sans incident.

99^o cas : Isabelle G. 10 jours.

Poids à l'entrée : 2.850 (Poids de naissance)

Régime habituel : 6 biberons de 90 g. lait Gallia Vert

Le premier jour, l'enfant reçoit 420 g. de carotte, 60 g. de babeurre et une demie mesure de farine ; le 2^o jour, 180 g. de carotte et 300 g. de babeurre, puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait et le 6^o jour, elle a un régime normal comprenant 300 g. de lait. Elle pèse alors 3.200 g. (gain de 350 g.).

Trois semaines plus tard apparaît une nouvelle diarrhée. L'enfant a 5 semaines et pèse 3.800 g. On donne le premier jour 660 g. de carotte et 3 M.F. Le 2^o jour, elle a 200 g. de babeurre, 300 g. le 3^o jour et 500 g. le 4^o ; puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait, et le 9^o jour, elle a un régime normal comprenant 500 g. de lait. Elle pèse alors 4.100 g. (gain de 300 g.).

- Réalimentation rapide. Une rechute 3 semaines plus tard cédera aussi facilement.

100° cas : Nadine F. 5 mois.

Poids à l'entrée : 5.100 g.

Régime habituel : 5 biberons de 140 g. de lait de vache

Les trois premiers jours, l'enfant reçoit 760 g. de carotte et 8.M.F. on donne 200 g. de babeurre le 4° jour, 400 g. le 5° jour et 500 g. le 6° jour, puis on remplace chaque jour 100 g. de babeurre par 100 g. de lait, et ainsi, l'enfant a un régime normal au 11° jour : 500 g. de lait et 10 M.F. Elle pèse 6.000 g. et a grossi de 900 g.


- Réalimentation rapide, sans incident.

Nous avons vu les dossiers des 100 derniers nourrissons de moins de 20 mois hospitalisés dans le service pour diarrhée aiguë. L'influence du sexe sur cette affection paraît nulle puisque nous avons 50 cas chez des filles et 50 garçons. Nous avons retrouvé une infection otitique dans 40 % des cas. La fréquence suivant le poids est la suivante :

de 0 à 5 000 g.....	24 %
de 5 000 à 6 000 g.....	19 %
de 6 000 à 7 000 g.....	9 %
de 7 000 à 8 000 g.....	14 %
de 8 000 à 9 000 g.....	20 %
plus de 9 000 g.....	14 %

Fréquence suivant l'âge :

Nombre de cas



On voit sur ce tableau que la fréquence est maxima entre 3 et 8 mois, puisque pour cette période on a 45 % des cas.

Fréquence suivant l'âge et le régime :

AGE	LAIT	LAIT + FARINE	4 REPAS	TOTAL
0 à 30 jours	4			4
30 à 60 jours	6	2		8
2 mois	4	1		5
3 mois	5	5		10
4 mois	4	4		8
5 mois	7	2		9
6 mois	1	4	3	8
7 mois	1	3	6	10
8 mois	1		3	4
9 mois			4	4
10 mois	2		3	5
11 mois			4	4
12 mois		1	2	3
13 mois		2	5	7
14 mois			4	4
Plus de 14 mois			7	7
TOTAL	35	24	41	

On voit en particulier que sur 65 enfants de plus de 5 mois, nous en avons reçu 12 qui étaient nourri seulement au lait et 12 qui recevaient du lait et de la farine, soit 35 % dont l'ablactation n'était pas commencée.

La réalimentation a pu être faite rapidement et sans incident dans 60 % des cas ; les rechutes tardives (plus d'une semaine après le retour au régime normal) se sont produites dans 6 % des cas.

Les coprocultures ont montré :

- pas de germe pathogène : 30 %

- colibacilles pathogènes : 50 %

- germes divers : 20 %

levures : 9 %

proteus : 7 %

entérocoque, staphylocoque non pathogène, klebsiella

aérobacter, aérobacter aérogénés, une fois.

-:-:-:-:-

C O N C L U S I O N S

1°) La réalimentation doit être précoce et très progressive : l'alimentation normale n'a pu être rétablie que dans un délai de douze jours en moyenne, ce délai pouvant atteindre 20 jours et même plus lorsque l'enfant présente une susceptibilité particulière au lait.

2°) Il semble que cette réalimentation soit particulièrement délicate chez les enfants qui avaient eu un régime très incorrect avant leur entrée dans le service, puisque c'est chez ces enfants que nous avons remarqué le plus grand nombre de rechutes.

3°) L'application correcte du schéma classique nous a permis d'obtenir les résultats suivants :

- 90 enfants sur 100 ont repris rapidement leur régime normal.
- 5 enfants sur 100 ont présenté une rechute qui a nécessité la reprise du traitement.
- 5 enfants sur 100 ont décédé dans le service, dont 3 d'une affection intercurrente (syndrome hémorragique, coqueluche).

-:-:-:-:-

Vu, le Président de Thèse.

Professeur JULIEN-MARIE

Vu, le Doyen de la Faculté

Professeur G. CORDIER

Vu et Permis d'imprimer

Le Recteur de l'Académie de Paris

J. ROCHE

- BIBLIOGRAPHIE -

DEBRE R. - LELONG M.

Pédiatrie.

Flammarion, Edit. Paris

LEVESQUE - BASTIN et LAFOURCADE.

Rapport au XII Congrès de Pédiatrie de Langue Française 1949.

J. MARIE - LELONG.

Archives françaises de Pédiatrie 9, n°6 1952.

JENNE et Collaborateurs.

Pédiatrie, tome IX, n°4, 1954.

LEVESQUE et HARDOUIN.

Le nourrisson, Mars-Avril 1953.

G. CATHALA et Collaborateurs.

Presse Médicale 1961, pp. 1185-1187 et 1417-1418.

Cl. BARRE.

Comment réhydrater un nouveau-né.

Vie Médicale 41 - Méd. Thér. 2 : 61, 1960.

R. BERNARD - P. MAESTRAGGI - P. et M. CASTERET.

Réflexions sur la thérapeutique actuelle des toxicoses et syndromes aigus du nourrisson. Bilan de quatre ans de fonctionnement d'un centre de Réanimation Médicale.

Pédiatrie XIII, 3 : 259, 1958.

P. BERTOYE.

Les signes d'alarme au cours des maladies du nourrisson.

Lyon Médical 38 : 459, 1959.

J. BOYER - G. BLANCHER.

Epidémiologie et prophylaxie des toxicoses infectieuses des nourrissons.

XXXIX^e Congrès d'Hygiène, Paris 1959.

C.R. in Concours Médical 30; 1960.

J. CHAPTAL - R. JEAN - H. BONNET - Mme D. DOSSA - Mme et M. CRASTES de PAULET -

P. CRISTOL - J. PETIT - A. MANDIN - J.M. EMBERGER - LE SEIGNEUR - R. GUILLAUMOT -

Etudes sur le syndrome de déshydratation aiguë du nourrisson et son évolution sous l'effet du traitement.

Arch. Fr. Pédiatrie XVI, 2 : 221, 1959.

J.J. CHEVRIE.

Syndrome toxique du nourrisson.

Gazette des Hôpitaux 20 : 863, 1960.

H. LESTRADET.

Principes directeurs et conduite du traitement dans la réhydratation du nourrisson.

Semaine des Hôpitaux 9 - 2 : 558, 1958.

H. LESTRADET.

Equilibration électrolytique et nutritionnelle des syndromes de déshydratation aiguë du nourrisson - Pathologie et Biologie VII, 21-22 : 2345, 1959.



**AGEMP
POLYCOPIE**

**8, rue Dante
PARIS - V •**

Téléphone : ODfon 58-96